

УДК 576.895.121:591.69.9

Д. Д. Завалеева


## ОБНАРУЖЕНИЕ У ЛЕСНОЙ МЫШИ НЕСВОЙСТВЕННОЙ ЕЙ ЦЕСТОДЫ

Во время сбора гельминтологического материала от грызунов Крыма в тонком кишечнике лесной мыши (*Apodemus sylvaticus* L.) нами найдена цестода *Orthoskrjabinia bobica* (Clerc, 1903). Ранее в СССР этот вид был обнаружен А. А. Спасским (1946) у птиц и Юнь-Лянь (1962—1963) у полевой мыши (*A. agrarius* Pall.). В распоряжении Юнь-Лянь были неполовозрелые экземпляры цестод, мы же располагаем половозрелыми особями, описание которых приводим ниже.

СЕМ. PARUTERINIDAE (MOLA, 1929) SKRJABIN, 1940

РОД *ORTHOSKRJABINIA* SPASSKY, 1947Вид *Orthoskrjabinia bobica* (Clerc, 1903)

Описание. Длина стробилы 40 мм при максимальной ширине 0,7146 мм. Ширина сколекса 0,4343 мм. Сколекс снабжен 4 присосками, диаметр которых 0,1810 мм. Длина шейки 1,9490 мм. Стробила краспедонтного типа, размеры гермафродитных

*Orthoskrjabinia bobica* (Clerc, 1903):

а — сколекс; б — поперечный срез зрелого членика; в — продольный срез зрелого членика; г — зрелый членик (оригинал); д — аномалия в строении стробилы (оригинал).

члеников  $0,6497 \times 0,1516$ , зрелых —  $0,8446 \times 0,5415$  мм. Экскреторная система состоит из 2 пар продольных сосудов, ширина дорсальных сосудов  $0,0096$ , вентральных —  $0,0181$  мм.

Половой аппарат одинарный, половые отверстия чередуются неправильно и открываются в середине края членика. В члениках 10 семенников, расположенных двумя группами, диаметр семенников  $0,0543$  мм. Бурса цирруса ( $0,0679 \times 0,0407$  мм) имеет вид тонкостенного мешочка грушевидной формы, впадающего в клоаку, величиной  $0,0226 \times 0,0181$  мм. Женские половые железы расположены медианно в задней половине членика. В члениках размером  $0,0866 \times 0,5630$  мм яичник достигает в поперечнике  $0,1131$  мм, желточник —  $0,0362$  мм. В члениках, матка которых заполнена яйцами, орган Крети грибовидной формы, ширина шаровидного придатка  $0,1222$  мм, ширина подошвы —  $0,2941$  мм. Размеры зрелых члеников  $0,4115 \times 0,9745$  мм, органа Крети, окружающего матку с яйцами, —  $0,2815 \times 0,5847$  мм, остаток шаровидного придатка принимает бобовидную форму, его размер  $0,0679 \times 0,1764$  мм (рисунок, з).

Яйца округлой формы  $0,0226 \times 0,0317$  мм.

При изучении одной из стробил мы обнаружили очень интересную аномалию в ее строении. Стробила состояла из краспедонтных члеников, длина передней части которых  $0,7796$  мм, задней —  $0,9523$  мм (рисунок, д). На расстоянии  $36,1019$  мм от переднего конца тела членики повернуты на  $180^\circ$  и длина их передней части равна  $0,9529$ , задней —  $0,8013$  мм. В нормальных члениках ближе к передней части членика обычно лежит орган Крети, затем матка с яйцами. В аномальных члениках ближе к передней части лежит матка с яйцами, а затем орган Крети. Таким образом, 11 члеников явились как бы зеркальным отражением нормальных члеников стробилы.

## ЛИТЕРАТУРА

- Спаский А. А. 1946. К познанию фауны цестод птиц Союза ССР. Гельминтологический сборник, посвященный акад. К. И. Скрябину. М., с. 252—262.  
 Юнь-Лянь. 1962—1963. Обнаружение цестоды птиц *Orthoskrjabinia bobica* (Clerc, 1903) у грызунов. *Helminthologia*, т. 4, № 1—4, с. 178—182.

Симферопольский университет

Поступила в редакцию  
6.II 1974 г.

УДК 597.6:576.895(282.247.32)

Л. М. Анцышкіна, В. Л. Булахов, Г. И. Палагіна, В. С. Магуза

## ГЕЛЬМИНТОФАУНА НЕКОТОРЫХ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ ДОЛИНЫ р. САМАРЫ

Гельминтофауна амфибий на территории УССР изучена крайне неравномерно. Наиболее полно обследованы амфибии окрестностей Киева (Быховский, 1932; Мазурович, 1951), Советских Карпат (Мазурович, 1957, 1960, 1965), реки Северский Донец (Шевченко, 1956, 1957, 1963), дельты Дуная (Волгарь, 1959; Волгарь-Пастухова, 1959) и Украинского Полесья (Магуза, 1969, 1969а, 1971). Отрывочные сведения имеются о гельминтах амфибий Днепровского лимана (Гребницкий, 1872), среднего течения Днепра (Иваницкий, 1927, 1928, 1940), окрестностей Харькова (Власенко, 1930; Тимофеев, 1900) и Керчи (Исайчиков, 1925, 1926). Сведений о гельминтах амфибий долины реки Самара в литературе нет.

В 1972—1973 гг. нами было обследовано 206 амфибий, в т. ч. жерлянка краснобрюхая (*Bombina orientalis* L.) — 11; чесночница (*Pelobates fuscus* Latr.) — 46; жаба серая (*Bufo bufo* L.) — 3; лягушка озерная (*Rana ridibunda* Pall.) — 77, прудовая (*R. esculenta* L.) — 49; остромордая (*R. terrestris* Andr.) — 20. У обследованных амфибий обнаружено 22 вида гельминтов, из них относящихся к классу Trematoda — 14 видов, Nematoda — 7 и Acanthocephala — 1. Видовой состав гельминтов, экстенсивность, интенсивность инвазии и распределение гельминтов по хозяевам представлены в таблице.

Из 206 обследованных амфибий зараженными оказались 165, что составляет 80,1%. Наиболее заражены гельминтами лягушки озерная и прудовая, несколько меньше лягушка остромордая, чесночница, жерлянка краснобрюхая и жаба серая. Среди выявленных гельминтов опасными являются *Pneumonoeces variegatus*, *Codonocephalus urnigerus*, *Strigea srigis*, *Rhabdias bufonis*, *Rh. microoris*, *Opisthiogliphe ranae*. Они вы-